



EURÓPSKY IMUNIZAČNÝ TÝŽDEŇ 27.4. – 3.5.2025



REGIONÁLNY ÚRAD
VEREJNÉHO
ZDRAVOTNÍCTVA
SO SÍDLOM V MICHALOVCIACH

V dňoch od 27. apríla do 3. mája 2025 bude prebiehať už 20. ročník kampane Európskeho imunizačného týždňa (EIW).

**Hlavnou myšlienkou tohtoročnej kampane je slogan
„Očkovanie pre všetkých je v ľudských silách“**

Dôležité fakty



- Vďaka očkovaniu boli eradikované pravé kiahne, geografické rozšírenie divých poliovírusov bolo zredukované na dve krajiny a všetky deti môžu byť chránené pred osýpkami, ružienkou, čiernym kašľom, tetanom a záškrtom.
- Očkovanie zohralo dôležitú úlohu pri znižovaní detskej úmrtnosti. Od roku 1974 očkovacie látky zachránili 154 miliónov životov – to je viac ako 3 milióny životov ročne alebo 6 ľudí každú minútu po dobu piatich desaťročí.
- Starší dospelí a osoby s chronickými ochoreniami majú vyššie riziko vzniku závažného ochorenia chrípky, COVID-19, pneumokokového ochorenia a respiračného syncytiálneho vírusového ochorenia. Je preto potrebné chrániť svoje zdravie v každom veku, preto je vhodné sledovať možnosti odporúčaných očkovaní pre jednotlivé vekové kategórie

Dôležitá je prevencia



- **Ochorenia, ktorým sa dá predchádzať očkovaním, sa môžu vyskytnúť všade tam, kde sú oblasti neočkovaných alebo nedostatočne očkovaných osôb. Obzvlášť nebezpečné to môže byť pre malé deti, deti, ktoré z vážnych zdravotných dôvodov nemôžu byť očkované a osoby s chronickými a inými život ohrozujúcimi ochoreniami.**





REGIONÁLNY ÚRAD

VEREJNÉHO

ZDRAVOTNÍCTVA

SO SÍDLOM V MICHALOVCIACH

EURÓPSKY IMUNIZAČNÝ TÝŽDEŇ

27.4. – 3.5.2025



V dňoch od 27. apríla do 3. mája 2025 bude prebiehať už 20. ročník kampane Európskeho imunizačného týždňa (EIW).

**Hlavnou myšlienkou tohtoročnej kampane je slogan
„Očkovanie pre všetkých je v ľudských silách“**

- Európsky imunizačný týždeň má dať do popredia nielen benefity očkovania pre dnešnú dobu – ako očkovanie chráni životy v súčasnosti, ale aj to, čo je možné dosiahnuť očkovaním v nasledujúcich desaťročiach. Čím viac detí a dospelých bude zaočkovaných, tým viac ľudí bude mať chránené svoje zdravie



REGIONÁLNY ÚRAD

VEREJNÉHO

ZDRAVOTNÍCTVA

SO SÍDLOM V MICHALOVCIACH

EURÓPSKY IMUNIZAČNÝ TÝŽDEŇ

27.4. – 3.5.2025



Spravodlivý prístup v očkovaní

- **Európsky imunizačný týždeň propaguje život zachraňujúcu silu očkovania, potrebu chrániť ľudí všetkých vekových kategórií pred ochoreniami, ktorým je možné predchádzať očkovaním.**
- **Každý si zaslúži benefity očkovania, no tisíce detí narodených v európskom regióne a milión detí po celom svete sa k očkovacím látkam nedostanú, taktiež stále veľa starších dospelých nemá prístup k život zachraňujúcim očkovacím látkam proti chrípke a iným ochoreniam.**
- **Ochorenia, ktorým sa dá predchádzať očkovaním, sa môžu vyskytnúť všade tam, kde sú oblasti neočkovaných alebo nedostatočne očkovaných osôb. Obzvlášť nebezpečné to môže byť pre malé deti, deti, ktoré z vážnych zdravotných dôvodov nemôžu byť očkované a osoby s chronickými a inými život ohrozujúcimi ochoreniami.**

Každý z nás sa môže podieľať na búraní bariér v súvislosti s očkovaním !

„Očkovanie pre všetkých je v ľudských silách“



REGIONÁLNY ÚRAD
VEREJNÉHO
ZDRAVOTNÍCTVA
SO SÍDLOM V MICHALOVCIACH

EURÓPSKY IMUNIZAČNÝ TÝŽDEŇ

27.4. – 3.5.2025



Infekcia HPV – otázky a odpovede

❖ Kto je vystavený riziku?

My všetci – ženy aj muži.

❖ V akom veku najčastejšie dochádza k infekcii vírusom HPV?

Vo veku 15-24 rokov

❖ Aká je šanca, že sa s HPV stretnem?

Asi 80 %, t.j. 8 z 10 ľudí sa s HPV stretne počas svojho života.

❖ Ako sa môžeme nakaziť?


- priamym kontaktom s infikovanou osobou (aj zdieľaním spoločných predmetov)
- dotykom slizníc alebo pokožky (aj bozkávaním)
- dominuje prenos pohlavným stykom

❖ Aké sú prejavy?

- kožné bradavice, bradavice v oblasti pohlavných orgánov
- výrastky na hrtane alebo hltane
- zhubné nádory kože
- rakovina (krčka maternice, vulvy, vagíny, penisu, konečníka, krku)

❖ Existuje prevencia?

- zdržanlivosť a vernosť
- očkovanie, preventívne prehliadky a skrining



OSÝPKY

Osýpky nie sú bežné detské ochorenie. Ide o vysoko nákazlivé vírusové ochorenie, ktoré sa medzi neočkovanými veľmi ľahko šíri.

Odhaduje sa, že až

90 %

ľudí, ktorí neboli kompletne zaočkovaní proti osýpkam, alebo ochorenie neprekonali, sa nakazí po kontakte s vírusom osýpok



Očkovanie proti osýpkam patrí medzi povinné

Očkovaním pomáhate zvyšovať odolnosť celej vašej komunity

Používa sa trivalentná očkovacia látka proti osýpkam, rubeole a mumpsu. **Prvá dávka** sa podáva v 15. až 18. mesiaci veku dieťaťa, **druhá dávka** sa podáva v 5. roku života*

OBVYKLÝ PRIEBEH

cca 10 až 12 dní od infekcie
príznaky podobné prechladnutiu
výtok z nosa, kašeľ a zvýšená teplota
oči začervenané, citlivé na svetlo

3. až 7. deň ochorenia
teplota stúpne na 39 - 41 °C
vyrážka (trvá cca 7 dní)




PRENOS OSÝPOK Kvapôčkami, najmä pri kašli a kýchaní.

Obdobie nákazlivosti začína krátko pred nástupom počiatočného štádia ochorenia a trvá 4 – 5 dní. S nástupom vyrážky rýchlo klesá.

NEPODCEŇUJTE KOMPLIKÁCIE V DÔSLEDKU INFEKCIE



ušná infekcia
s rizikom trvalého poškodenia sluchu



zápal pľúc
vážne ohrozuje najmä najmenších



opuch mozgu
môže mať trvalé následky



hnačka
s rizikom vzniku dehydratácie



poruchy zraku
s rizikom trvalého poškodenia



ÚRAD
VEREJNÉHO
ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ
REPUBLIKY

ČIERNY KAŠEĽ

je vysoko infekčné ochorenie postihujúce dýchacie cesty, ktoré spôsobuje vážne záchvaty kašľa. Patrí k najzávažnejším ochoreniam detského veku.



Pôvodcom ochorenia je
baktéria *Bordetella pertussis*

Prenos predovšetkým
kvapôčkovou infekciou



Priebeh ochorenia

1. štádium

- Horúčka u malých detí, staršie deti a dospelí bez horúčky alebo s mierne zvýšenou teplotou
- únava
- nechutenstvo
- nádcha, kýchanie
- občasný, mierny a neproduktívny kašeľ

2. štádium

- U najmenších detí nočné záchvaty suchého, dráždivého kašľa (trvajú min. 2 týždne, ale aj 2 mesiace) s typickým štekavým nadýchnutím a následným krátkym viacnásobným kašľaním

3. štádium

- Uzdravovanie, tzv. rekonvalescencia
- záchvaty kašľa ustupujú počas niekoľkých týždňov

Najúčinnejším prostriedkom v prevencii čierneho kašľa je očkovanie



Imunita u dospelých časom klesá. Dospelí a adolescenti môžu baktériu preniesť na novorodencov a dojčatá, **informujte sa u lekára o možnosti preočkovania proti čiernemu kašľu.**



ÚRAD
VEREJNÉHO
ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ
REPUBLIKY



REGIONÁLNY ÚRAD

VEREJNÉHO

ZDRAVOTNÍCTVA

SO SÍDLOM V MICHALOVCIACH

EURÓPSKY IMUNIZAČNÝ TÝŽDEŇ

27.4. – 3.5.2025



Žltáčka typu A - otázky a odpovede

❖ Kto je vystavený riziku?

Každý, kto nemá imunitu po prekonaní ochorenia alebo po očkovaní

❖ Ako sa môžeme nakaziť?

Nakaziť sa môžeme prehltnutím znečistených potravín, vody, pri úzkom kontakte s chorou osobou a znečistenými rukami.

❖ Aké sú prejavy ochorenia?

Ochorenie začína zvýšenou teplotou, bolesťami pod pravým rebrom, únavou, vracaním, nevoľnosťou a nechutenstvom. V neskoršom štádiu sa môže, ale nemusí u každého chorého, objaviť žlté sfarbenie kože a očného bielka, tmavý moč a svetlá stolica.

❖ Aké sú možnosti prevencie?

- dôsledné dodržiavanie osobnej hygieny, predovšetkým rúk,
- dodržiavanie čistoty v domácnosti,
- konzumácia zdravotne nezávadných potravín a vody,
- správna manipulácia s odpadmi
- **OČKOVANIE**, ktoré sa:
 - odporúča osobám vo zvýšenom riziku nákazy,
 - nariaďuje osobám v priamom kontakte s chorou osobou





REGIONÁLNY ÚRAD

VEREJNÉHO

ZDRAVOTNÍCTVA

SO SÍDLOM V MICHALOVCIACH

EURÓPSKY IMUNIZAČNÝ TÝŽDEŇ

27.4. – 3.5.2025



Záškrt – otázky a odpovede

❖ Kto môže ochoriť?

Každý, kto nemá dostatočnú imunitu – neprekonal ochorenie alebo nebol zaočkovaný

❖ Ako sa môžeme nakaziť?

Najčastejšie sa môžeme nakaziť vdychovaním kontaminovaného vzduchu, kvapôčkovou infekciou, ale prenos ochorenia môže byť aj prostredníctvom kontaminovaného prachu, predmetov a potravín

❖ Ako sa ochorenie prejavuje?

Katarálna forma postihuje dýchacie cesty a prejavuje sa bolesťou v krku, teplotou, vznikom pablán na mandliach, môže dôjsť k ochrnutiu hlasiviek a prehýtacích svalov.

Kožná forma sa prejavuje ohraničenými léziami a ulceráciami.

❖ Aké môžu byť komplikácie ochorenia?

Ochorenie spôsobuje baktéria produkujúca toxín (jed), ktorý prechádza do krvného obehu a môže poškodiť srdce, nervy, obličky, stredné ucho.

❖ Aké sú možnosti prevencie?

Najúčinnejším spôsobom ochrany je očkovanie.

